



**Opis**

Klobuk moe biti od 3 do 7 centimetara širok, dok visok moe biti i preko 15 centimetara. Kod mladih primjeraka, klobuk je elipsoidno izduljen. U starijih primjeraka, klobuk poprima oblik zvona. Ina?e je cijela gljiva bijele boje, dok stariji primjerci na pojedinim dijelovima mogu biti blago sme?e boje. Stru?ak je valjkast i upalj, te na dnu blago zadebljan. Listi?i su vrlo gusti te su u ranoj dobi bijele boje, a kasnije tamne i pretvaraju se u teku?inu nalik na tintu. Otisak spora je crne boje.

**Kemijske reakcije**

Donji dijelovi kore stru?ka s gvajakolom daju plavkasto zelenu boju, dok meso stru?ka poprima zlatno utu boju u reakciji s eljezovim sulfatom.

**Stani?e**

Relativno ?esta vrsta koja raste po travnatim povr?inama, pogotovo ako su nagojene. Moe izrasti i u naseljima, uz puteve, na gnoju, u parkovima, uz rijeke. Uspijeva u raznim vrstama vegetacije. Ova vrsta se prvenstveno moe na?i u Europi, Sjevernoj Americi i Australiji.

**Doba**

Ova gljiva raste u prolje?e, od ?etvrtog do ?estog mjeseca, te nakon toga ponovno u jesen, od devetog do dvanaestog mjeseca.

**Jestivost**

Vrlo cijenjena i ukusna gljiva. Bitno je napomenuti da se za jelo prvenstveno koriste primjerci koji nisu potamnili, pa ?ak niti po?eli tamniti (u po?etnoj fazi, prvo se pojavi crvenkasta boja).

**Sli?ne vrste**

normal;">Gotovo da i ne postoji mogućnost da se ova gljiva zamijeni nekom otrovnom vrstom. Eventualno je moguća zamjena sa nekom od drugih gljiva iz roda Coprinus, kod kojih u pravilu u početnim fazama propadanja, listi?i ne poprimaju crvenu boju.</span></p> <p style="display: inline !important;"><span style="font-weight: normal;"><br /></span></p> </strong> <p>◆</p> </strong></p> <p>◆</p>